

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura:			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Viticultura:			
In generale	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
In generale	Monocotiledoni annuali (malerbe)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Orticultura:			
Asparagi	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua, dopo il raccolto	1
Asparagi	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua, dopo il raccolto	2
Barbabietola, Cipolle, Piselli, Pomodori, Porro, Scorzonera, Sedano	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Barbabietola, Cipolle, Piselli, Pomodori, Porro, Scorzonera, Sedano	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Broccoli, Cavolfiore	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1–1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Broccoli, Cavolfiore	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	2
Carote, Fagioli, Finocchio selvatico, Spinaci	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Carote, Fagioli, Finocchio selvatico, Spinaci	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Cavoli cinesi, Cavolo cappuccio (bianco, rosso, verza), Cavolo rapa	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1–1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	1
Cavoli cinesi, Cavolo cappuccio (bianco, rosso, verza), Cavolo rapa	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane	2

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero, Colza, Fava, Girasole, Soia	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero, Colza, Fava, Girasole, Soia	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Luppolo	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Luppolo	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Patate	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, prima della chiusura dei cespi	1
Patate	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 8 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua, prima della chiusura dei cespi	2
Piselli per conserve	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Piselli per conserve	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Piselli proteici	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Piselli proteici	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: in 300–500 l di acqua	2
Tabacco	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1
Tabacco	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione piante ornam.:			
In generale	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1, 3
In generale	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2, 3
Selvicoltura:			
Vivai forestali	Monocotiledoni annuali (malerbe), Ricacci di cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	1, 3
Vivai forestali	Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: in 300–500 l di acqua	2, 3
Superfici di comp. ecol. secondo OPD:			
fascie di colture estensive in campicoltura, maggese da rotazione, maggese fioriti	Gramigno	Concentrazione: 1 % Applicazione: con vaporizzatore a zaino	4

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = Non è efficace contro la Poa annua.

2 = L'utente deve essere informato del fatto che l'efficacia contro le malerbe pluriennali, in particolare la gramigna, di regola non si estende oltre la durata della coltura trattata.

3 = Indicare le colture e la loro tollerabilità.

4 = Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

6 ottobre 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch