

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 19 ottobre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Deltametrina 25 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Realchemie Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4345 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 042973-00/021 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4346 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 042973-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4347 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 042973-00/015 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4349 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 042973-00/041 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4350 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 042973-00/031 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

¹ RS 916.161

Star Deltamethrin	Numero di omologazione svizzero: D-4632 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-042973-00/079 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Decis 2,5 EC	Numero di omologazione svizzero: D-4633 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-042973-00/080 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
AGRO DELTAMETHRIN	Numero di omologazione svizzero: D-4714 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-042973-00/044 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
Lampone	Verme del lampone	Concentrazione: 0.04 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3, 4
Orticoltura:			
Carote	Afidi , Psilla della carota	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	3
Carote, Sedano	Mosca della carota	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane	3, 5
Cipolle, Porro	Tripidi	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	3
Fagioli	Larve di piralidi e larve di sfingidi	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 3, 6
In generale	Nottue terricole o vermi grigi	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 3
Piselli per conserve	Tortrice del pisello	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 3
Serra: Funghi commestibili	Sciaridi	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 0.5 l/m ² Termine d'attesa: 3 settimane	7
Serra: in generale	Aleurode del cavolo, Aleurode delle serre, Punteruolo degli steli di cavoli, Punteruolo delle galle dei cavoli	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 giorni	
Serra: in generale	Aleurode del cavolo, Aleurode delle serre	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 giorni	
Specie di cavoli	Cavolaie, Nottua del cavolo	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	3
Specie di cavoli	Cecidomia del cavolo, Punteruolo degli steli di cavoli, Punteruolo delle galle dei cavoli	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	3, 8

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Barbabietola da zucchero	Altica della barbabietola	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	3
Barbabietola da zucchero	Nottue terricole o vermi grigi	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	3
Cereali	Cloropo del grano	Dosaggio: 0.3 l/ha	1, 3
Cereali	Afidi [Vettori di virus]	Dosaggio: 0.3 l/ha Applicazione: in autunno.	3
Colza	Altica della colza, Meligete della colza, Punteruolo delle silique delle Crocifere, Tentredine delle Crocifere Efficacia parziale: Cecidomia delle silique delle Crocifere	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: allo stadio di germogliamento, prima della fioritura.	1, 3
Colza	Punteruolo degli steli delle Crocifere	Dosaggio: 0.3 - 0.4 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane Applicazione: allo stadio di germogliamento, prima della fioritura.	1, 3
Luppolo	Afide del luppolo	Concentrazione: 0.03 % Termine d'attesa: 3 settimane	1, 3
Mais	Mosca frit	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 6 settimane	3
Patate	Dorifora della patata	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 3
Piselli proteici	Tortrice del pisello	Dosaggio: 0.3 l/ha	1, 3
Soia	Vanessa del cardo	Dosaggio: 0.3 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	3
Coltivazione piante ornam.:			
Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Larve defogliatrici, Nottue terricole o vermi grigi	Concentrazione: 0.05 %	1, 3, 9
Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Tripidi	Concentrazione: 0.05 %	1, 3, 9, 10
Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Afidi , Aleurode delle serre	Concentrazione: 0.1 %	1, 3, 9, 10, 11
Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Crisomelidi	Concentrazione: 0.1 %	1, 3, 9
Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Cocciniglie del genere lecanio	Concentrazione: 0.1 % Applicazione: (= 50 g principio attivo/ 50 000 granoturco) sementi.	1, 3, 9, 11

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera).
 - 2 = Per i lamponi autunnali non è necessario combattere questo parassita/questi parassiti.
 - 3 = SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 20 m rispetto alle acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di riduzione della deriva riportate nelle istruzioni dell'UFAG.
 - 4 = Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio «inizio fioritura fino a 50 % dei fiori aperti», trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150–170 cm d'altezza.
 - 5 = Irrorare solo in caso di volo e attacco deboli (secondo numero critico delle catture) ogni 10–14 giorni.
 - 6 = Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.
 - 7 = Spruzzare o nebulizzare nell'ambiente. Non spruzzare direttamente sulle colture né sui corpi fruttiferi.
 - 8 = Trattamento sulle file con 500 l/ha nel cuore della pianta.
 - 9 = Non impiegare su colture pluriennali (boschetti [latifoglie, conifere, arbusti] e cespugli).
 - 10 = Adeguato soltanto contro ceppi non resistenti.
 - 11 = Non nebulizzare o vaporizzare.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 ottobre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch