

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 2 novembre 2010

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Mancozeb 64 %  
Metalaxil-M 4 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

### *2. Prodotti commerciali*

Realchemie Mancozeb & Metalaxyl-M

Numero di omologazione svizzero: D-4443  
Paese di origine: Germania  
Numero di omologazione straniero: PI 004412-00/003  
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione di bacche:</b>			
Fragola	Fitoftora della fragola, Marciume radicale della fragola	Concentrazione: 0.5 % Dosaggio: 0.1 l/pianta Applicazione: annaffiare una volta sola immediatamente dopo la piantagione in terreno umido.	1, 2
Lampone	Marciume radicale del lampone	Concentrazione: 0.25–0.5 % Dosaggio: 2.5–5 kg/ha Applicazione: annaffiare un'area larga 40–50 cm.	2, 3, 4
Mora	Mycosphaerella rubi, Peronospora della mora [Peronospora (Peronospora sparsa)]	Concentrazione: 0.25–0.5 % Dosaggio: 2.5–5 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare.	2, 4, 5

<sup>1</sup> RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Orticoltura:</b>			
Aglio, Cipolle, Scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 2.5–3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	6
Erbette da cucina	Peronospora (diverse specie) su erbe da cucina	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	7, 8
Insalate (Asteracee)	Alternaria spp., Peronospora della lattuga, Ruggini	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	9, 10
Lattuga cappuccio, Lattuga romana	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.9–2.5 kg/ha	11
Melanzana, Pomodori	Peronospora del pomodoro, Septoriosi del pomodoro/ della melanzana	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.5–3.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	6
Meloni	cladosporiosi delle cucurbitacee, Peronospora delle Cucurbitacee	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	10, 12
Ruola	Alternaria spp., Peronospora delle crucifere, Phoma, Pythium spp., Ruggine bianca	Dosaggio: 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	9, 10
Spinaci	Peronospora dello spinacio, Ticchiolatura dello spinacio	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: trattamento dello stadio di 4 foglie fino all'inizio dello stadio di 6 foglie.	13
<b>Campicoltura:</b>			
Luppolo	Peronospora del luppolo	Dosaggio: 2.5 g/l d'acqua Termine d'attesa: 2 settimane	14
Patate	Alternariosi delle Solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 2.5 kg/ha	15, 16, 17, 18
Tabacco	Peronospora del tabacco	Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: in estate.	
<b>Coltivazione piante ornam.:</b>			
In generale	Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini	Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.5 g/l d'acqua	6

#### (\*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = Efficacia insufficiente in suoli fortemente contaminati.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = Al massimo 2 trattamenti all'anno soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto.
- 4 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m<sup>3</sup>/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio da inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m<sup>3</sup>/ha.
- 5 = Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 6 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
- 7 = Al massimo 2 trattamenti per stagione.
- 8 = 1° trattamento all'inizio dell'infestazione, da ripetersi dopo 3 settimane.
- 9 = Al massimo 3 trattamenti.
- 10 = 1° trattamento all'inizio dell'infestazione.

- 
- 11 = 1–2 trattamenti al più tardi entro 14 giorni dopo la piantagione. Per l'ultimo trattamento impiegare soltanto una dose bassa.
  - 12 = Al massimo 6 trattamenti.
  - 13 = Spinaci invernali: 3 settimane di termine d'attesa.
  - 14 = Al massimo 3 trattamenti a intervalli di 10–14 giorni. Alternare con un prodotto di contatto al più tardi 7 giorni dopo l'ultima applicazione di questo prodotto.
  - 15 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m<sup>3</sup>/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m<sup>3</sup>/ha.
  - 16 = 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.
  - 17 = Fungicidi a base di Fenilamide: possono essere effettuati al massimo 3 trattamenti all'anno, al più tardi entro il 31 luglio. Intervalli fra le irrorazioni al massimo di 14 giorni in caso di trattamenti consecutivi.
  - 18 = Non applicare su patate da semina né su colture protette di patate (fogli di plastica).
- 

### **Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente..

2 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch