

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 2 novembre 2010

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Clofentezine 500 g/l  
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

### *2. Prodotti commerciali*

Clofentezine 500      Numero di omologazione svizzero: D-4601  
Paese di origine: Germania  
Numero di omologazione straniero: PI-033756-00/03  
Titolari stranieri di autorizzazioni : Menora GmbH

## **Applicazioni autorizzate:**

| Campo d'applicazione                    | Agente patogeno/Azione                    | Applicazione                                                                                                                                                                                                       | (*)     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Coltivazione di bacche:</b>          |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| In generale                             | Ragnetti                                  | Concentrazione: 0.06 %<br>Dosaggio: 0.6 l/ha<br>Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto.                                                                                                            | 1, 2, 3 |
| <b>Frutticoltura:</b>                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Frutta a granelli,<br>frutta a nocciolo | Efficacia parziale: eriofidi<br>rugginosi | Concentrazione: 0.04 %<br>Dosaggio: 0.64 l/ha<br>Termine d'attesa: 3 settimane<br>Applicazione: dopo la fioritura<br>entro il 30 giugno, unicamente<br>dopo un'applicazione post-<br>florale contro i ragni rossi. | 1, 4    |
| Frutta a granelli,<br>frutta a nocciolo | Ragnetti                                  | Concentrazione: 0.04 %<br>Dosaggio: 0.64 l/ha<br>Termine d'attesa: 3 settimane<br>Applicazione: prima e dopo la<br>fioritura, entro il 30 giugno.                                                                  | 1, 4    |

<sup>1</sup> RS 916.161

| Campo d'applicazione                                                                                         | Agente patogeno/Azione        | Applicazione                                                                                                                     | (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Viticultura:</b>                                                                                          |                               |                                                                                                                                  |     |
| In generale                                                                                                  | Ragnetti                      | Concentrazione: 0.04 %<br>Applicazione:<br>entro il 30 giugno.                                                                   | 1   |
| <b>Orticultura:</b>                                                                                          |                               |                                                                                                                                  |     |
| Serra: cetrioli                                                                                              | Ragnetti                      | Concentrazione: 0.04 %<br>Termine d'attesa: 2 settimane                                                                          | 1   |
| <b>Coltivazione piante ornam.:</b>                                                                           |                               |                                                                                                                                  |     |
| Serra: arbusti, boschetti (al di fuori del bosco), fiori estivi, fiori recisi, pianta in vaso e in container | Ragnetto giallo comune        | Concentrazione: 0.04 %<br>Applicazione: per colture in pieno campo: trattamento da maggio.                                       | 1   |
| Serra: arbusti, boschetti (al di fuori del bosco), fiori estivi, fiori recisi, pianta in vaso e in container | Ragnetto rosso dei fruttiferi | Concentrazione: 0.04 %<br>Applicazione: per le colture in pieno campo: trattamento solo dopo ca. 2 settimane dal germogliamento. | 1   |

#### (\*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Irrorazioni con acaricidi contenenti Clofentezine ed Essitiazox provocano un aumento delle resistenze. Questa è la ragione per la quale nella stessa particella occorre effettuare soltanto un trattamento per stagione, con prodotti di questo gruppo.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m<sup>3</sup>/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio da inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m<sup>3</sup>/ha
- 4 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m<sup>3</sup>/ha.

#### Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

#### Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

2 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch