

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Mancozeb 75 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali

Asar WDG

Numero di omologazione svizzero: I-2744

Paese di origine: Italia

Numero di omologazione straniero: 189

Titolari stranieri di autorizzazioni: Dow AgroSciences B.V.

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.15 % Dosaggio: 2.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1
Frutta a nocciolo	Ruggine del susino, vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmina carpophila</i>)	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1
In generale	Lepri, conigli [Protezione contro i danni casuati dalle lepri]	Concentrazione: 6 % Applicazione: in combinazione con il 5 % di Ramag C (applicazione per spalmatura o per irrorazione).	

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
In generale	Pernospora della vite	Concentrazione: 0.25 %	2
In generale	Escoriosi della vite, marciume nero, rossore parassitario	Concentrazione: 0.3 %	2, 3
Orticoltura			
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago	Concentrazione: 0.2–0.3 %	
Carote	Altenariosi delle carote	Dosaggio: 2–3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	
Cipolle	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 2–3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	
Fagioli	Antracnosi del fagiolo, ruggine del fagiolo	Dosaggio: 2–3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4
In generale	Malattie legate al suolo (plantule, allevamento di piante giovani)	Concentrazione: 0.2–0.3 %	5
Lattuga cappuccio	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.6 kg/ha	6
Melanzana, Pomodori	Alternaria spp., peronospora del pomodoro, septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0.2–0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Sedano da coste, Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 2–3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	
Specie di cavoli [solo allevamento di piantine]	Peronospora delle crucifere	Dosaggio: 2–3 kg/ha	
Campicoltura			
Luppolo	Peronospora del luppolo [Infezioni secondarie]	Concentrazione: 0.2 % Termine d'attesa: 5 settimane Applicazione: dal germogliamento fino all'inizio della fioritura.	7
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	8, 9, 10
Tabacco	Peronospora del tabacco	Concentrazione: 0.2 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Coltivazione piante ornam.			
Conifere	Caduta degli aghi del pino e del pino marittimo	Concentrazione: 0.4 %	
Ginepro [in vivai]	Ruggine delle foglie (di ginepro)	Concentrazione: 0.4 %	
In generale	Maculature fogliari, peronospora, ruggini	Concentrazione: 0.2–0.3 %	
In generale	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Dosaggio: 500 g/m ³	
Primule	Ramulariosi della primula	Concentrazione: 0.2 %	

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Rose	Ticchiolatura della rosa	Concentrazione: 0.2–0.3 %	
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.2–0.3 %	

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = La dose si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
- 2 = Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.
- 3 = Anche per 1 applicazione per via aerea all'anno.
- 4 = Sotto protezione (vetro e plastica), il termine di attesa è di 1 settimana.
- 5 = Spruzzatura o irrorazione, non annaffiare.
- 6 = Dose massima per ogni irrorazione: 16 g/ara. Soltanto per l'allevamento di piantine. Applicazione al più tardi entro 14 giorni dopo la piantagione nell'ubicazione definitiva.
- 7 = Trattamenti a intervalli di 8–12 giorni.
- 8 = Trattamenti a intervalli di 7–10 giorni.
- 9 = Primo trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.
- 10 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Manfred Bötsch