

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Difenconazolo 250 g/l

Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Conazol+	Numero di omologazione svizzero: F-2606 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2040044 Titolari stranieri di autorizzazioni: Phyto – Service
Polyscore	Numero di omologazione svizzero: F-2618 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9700060 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Agro SAS
Score	Numero di omologazione svizzero: F-2619 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 8800841 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Agro SAS

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
Vite	Marciume nero, oidio della vite, rossore parassitario	Concentrazione: 0.0125 % Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3
Orticoltura			
Aglione, Cipolle, Porro, Scalogni	Alternariosi (Alternaria porri), cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, ruggini	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, ruggini	Dosaggio: 0.5-1 l/ha Applicazione: in estate.	4
Barbabietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Carote	Alternariosi delle carote	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Culture coperte: Cetrioli	Cancro gommoso [Cancro gommoso (Didymella bryoniae)]	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Erba cipollina	Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio.	4
Indivia, Lattuga cappuccio [insalata in pieno campo]	Marciume della lattuga	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4
Pomodori	Alternariosi delle Solanacee, oidio, septoriosi del pomodoro/della melanzana	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 giorni	4
Prezzemolo	Alternaria spp., necrosi fogliare del prezzemolo	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: entro 1 settimana dal taglio.	4
Sedano da condimento, Sedano da coste, Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Specie di cavoli	Maculature fogliari	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	4
Valerianella	Oidio	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: prima o immediatamente dopo la piantagione, al più tardi allo stadio di 4 foglie.	4
Campicoltura			
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 0.5 l/ha	5
Colza	Marciume del colletto e dello stelo [Marciume da Phoma (Phoma lingam)]	Dosaggio: 0.5 l/ha	6

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 8
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 9
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 0.5 l/ha	7, 10

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = Anche per applicazione per via aerea.
- 2 = Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 3 = Contro il rossore parassitario, in combinazione con 0.1 % di Folpet.
- 4 = Al massimo 4 trattamenti all'anno.
- 5 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
- 6 = Al massimo 1 trattamento su varietà sensibili in caso di attacco fogliare visibile tra la fase dell'accestimento e la formazione di 7 stoloni (BBCH 20–27).
- 7 = Al massimo 1 trattamento tra lo stadio fenologico di 2 nodi e l'inizio della fioritura (BBCH 32–61).
- 8 = Se oltre il 30 % delle foglie presenta sintomi d'infezione.
- 9 = A inizio infestazione.
- 10 = Su varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione (BBCH 37–61). Su varietà sensibili, dall'inizio dell'attacco.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch